



EXCELENTE ACTIVIDAD INSECTICIDA Y RESIDUALIDAD EXTREMA



DELTAMETRINA 2,5%

Formulado a base de Suspensión Concentrada

PRESENTACIÓN
Botellas de 1lts
Caja x 12 unidades



¿QUÉ CONTROLA?

INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES. Posee excelente efecto insecticida sobre insectos rastrojeros y voladores. También controla eficazmente arañas y escorpiones. En campañas de salud pública es elegido para realizar tratamientos para control de *Triatoma infestans* (vector de la enfermedad de Chagas) y *Anopheles* spp. (vector de paludismo).



ASPECTOS RELEVANTES

RUSTER® es el producto de elección para realizar tratamientos residuales. La Deltametrina, piretroide cristalino en su estado natural, es sometida a molienda para lograr su micronizado y posterior suspensión a base acuosa. Gracias a que no se utilizan solventes en la formulación, **RUSTER®** no produce manchado, carece de olores desagradables y no genera vapores. Puede actuar por contacto a nivel cuticular en los insectos o a través del tracto digestivo una vez ingerido. Por tratarse de un Piretroide genera alta irritación produciendo desalojo de nidos y sitios de agregación.



DOSIS DE USO

Insectos rastrojeros: 50 a 75 ml cada 5 litros de agua (para 100 m²).
Insectos voladores: 25 a 50 ml cada 5 litros de agua (para 100 m²).
Insectos vectores: 100 ml cada 5 litros de agua (para 100 m²).



¿DÓNDE SE APLICA?

Es fundamental aplicar este tipo de formulación en estructuras que permitan potenciar el efecto residual. En aplicaciones en intemperie, pasto, tierra, árboles, plantas en general y paredes externas descubiertas, el producto se encuentra sujeto a degradación por rayos UV, microorganismos, e hidrólisis por acción del agua de lluvia o rocío. En paredes externas protegidas de los factores ambientales o paredes internas, la residualidad de **RUSTER®** puede alcanzar los cuatro meses. Por tratarse de un piretroide formulado en base acuosa, puede aplicarse en clínicas, colegios, guarderías, edificios e industrias diversas. En producción pecuaria intensiva resulta sumamente efectivo para control de moscas.



BUEN USO

Debe diluise en agua de calidad y en dosis adecuada. A diferencia de los concentrados emulsionables, este tipo de formulación debe agitarse hasta lograr una correcta homogenización. Para lograr una barrera perimetral eficiente debe contemplarse una aplicación de alto volumen, con cilindro de compresión manual y boquilla de abanico plano (80° ángulo de descarga/flujo de 0,76 litros por minuto). La manera de lograr un rociado parejo en toda la superficie a tratar, se logra trabajando a presión constante (40 PSI, recomendación OMS). En campañas de salud pública, debe tratarse la totalidad de la superficie interna y externa de las viviendas. Esto se logra ubicando la boquilla a 0,45 metros de la pared, y comenzando a rociar en bandas ascendentes y descendentes (piso-techo-piso), superpuestas 5 cm entre ellas.



MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.

www.glebaambiental.com.ar



/glebaambiental



@glebaambiental