gleba
Una empresa anasac

IDEAL PARA EL CONTROL DE COLONIA DE HORMIGAS

www.glebaambiental.com.ar

/glebaambiental @glebaambiental

SULFLURAMIDA 3%

Formulado a base de Cebo Granulado

PRESENTACIÓN
Bolsa x 30 kgs.

¿QUÉ CONTROLA?

HORMIGAS. Hormiga cortadora de género Atta y Acromyrmex.

ASPECTOS RELEVANTES

MIREX GLEX® es un insecticida-hormiguicida formulado como cebo granulado para el control de hormigas cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex. Posee poder atractivo lo que determina que las hormigas tomen los gránulos llevándolos al interior del hormiguero, provocando en pocos días el control de la colonia. Su acción es lenta (3 a 5 días) siendo ésta la razón por la cual no es rechazado inmediatamente por la colonia de hormigas.

DOSIS DE USO

Hormiga minera (Atta sexdens), Hormiga Isaú (Atta wollenweiderii): 6 - 10 g / m2 de tierra suelta del hormiguero.
Hormiga negra del sud (Acromyrmex lobicornis), Hormiga negra común (Acromyrmex lundi), Hormiga colorada (Acromyrmex striatus), Hormiga invasora (Iridomyrmex humilis): 6 - 50 g por hormiguero (según tamaño).

¿DÓNDE SE APLICA?

Aplicar el cebo **MIREX GLEX®** preferentemente al atardecer, directamente desde el envase, sin contacto manual, a los costados de los caminos o sobre la senda de las hormigas, a una distancia de 20 cm a 1 m de la entrada. Nunca colocar los gránulos dentro de las bocas del hormiguero para evitar la devolución o reversión del mismo. No colocar el producto con las manos para evitar la pérdida de efectividad. No aplicar en la zona de combate otros insecticidas u hormiguicidas a fin de no afectar la atracción del mismo. La época de control es cuando están activos los hormigueros, evitando los días de lluvia o con temperaturas extremas.

BUEN USO

Es un producto formulado para aplicación directa, por lo que no requiere preparación previa Siendo un cebo granulado atractivo, no debe ser aplicado junto con otros plaguicidas. El producto no se aplica directamente sobre los cultivos.

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, DIRIGIRSE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O SERVICIO DE SALUD, LLEVANDO EL ENVASE O RÓTULO DEL PRODUCTO.